



دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پزشکی

پایان نامه دوره پزشکی عمومی

عنوان:

بررسی فراوانی سوء مصرف مواد مخدر و عوامل وابسته در بیماران

جراحی ارتوپدی بیمارستان باهنر در سال ۱۳۹۶

توسط:

مریم سالاری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مرتضی هاشمیان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسین طراوتی

سال تحصیلی:

۹۶-۹۷



Kerman University of Medical Sciences

Faculty of Medicine

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree

M D

Title:

Prevalence of drugs abuse and dependent factor in orthopedic
surgery patients in Bahonar Hospital at 2016

By:


Dr Maryam Salari

Supervisor/s:

Dr Morteza Hashemian

Year:

2018



چکیده:

زمینه و هدف: مواد مخدر به عنوان یک از دو عامل زمینه ای مهم در تقریباً تمام انواع تروما شناخته شده است. علی رغم شیوع بالای ناتوانی های وابسته به مواد افیونی و در دسترس بودن روش های مداخله ای سودمند، متأسفانه سوءمصرف آن همچنان در گروه زیادی از بیماران بستری در بیمارستان ها تشخیص داده نمی شود. بیمارستان می تواند مکان مناسبی برای تشخیص اولیه، درمان و آغاز مداخله های لازم بر روی این افراد باشد. این پژوهش جهت بررسی فراوانی سوءمصرف مواد مخدر و عوامل وابسته به آن در بیماران جراحی ارتوپدی بیمارستان باهنر در نیمه ی اول سال ۱۳۹۶ انجام گردید.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی، ۳۴۰ بیمارستان بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید باهنر کرمان مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به این افراد در پرسشنامه های که شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، نوع ترومای وارده، وضعیت مصرف کنونی سیگار و مواد مخدر والگل (طبق گفته خود فرد) ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقدار P کمتر از ۰,۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: ۳۷ درصد شرکت کنندگان تریاک، ۲۳ درصد شرکت کنندگان شیر، ۱۹ درصد شرکت کنندگان ناس، ۱۴ درصد شرکت کنندگان متادون، ۴ درصد شرکت کنندگان حشیش و ۳ درصد سایر مواد مخدر موجود را مصرف نمودند. ۶۷ درصد شرکت کنندگان در پژوهش مصرف سیگار و ۳۵ درصد افراد مصرف الکل را در کنار مواد مخدر ذکر نمودند. میانگین مدت زمان مصرف مواد مخدر در شرکت کنندگان $1/86 \pm 6/55$ روز بود. ۶۰ درصد افراد از روش تدخینی، ۳ درصد افراد از روش تزریقی و ۱۷ درصد افراد از روش خوراکی جهت مصرف مواد مخدر استفاده نمودند. توزیع فراوانی مصرف کنونی مواد افیونی در کل موارد بررسی شده ۳۲/۷٪ بود.

نتیجه گیری: از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر توأم با مشکلات عدیده ای در رابطه با روش های بیهوشی قبل از عمل های جراحی ارتوپدی می باشد، در صورت عدم توجه به آن می تواند جان بیمار را تهدید نماید. لذا غربالگری بیماران بخش ارتوپدی از نظر اعتیاد ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه: سوء مصرف، مواد مخدر، بخش ارتوپدی، کرمان

Abstract

Background: Drugs are known as a major contributor to nearly all types of trauma. Despite the high incidence of opioid dependence and the availability of useful interventions, unfortunately, abuse remains unclear in a large group of patients admitted to hospitals. The hospital can be a good place for initial diagnosis, treatment and initiation of interventions on these individuals. This study was conducted to determine the prevalence of drug abuse in patients with orthopedic surgery in Bahonar Hospital in 1396.

Materials and Methods: In this descriptive analytical cross-sectional study, 340 patients admitted to orthopedic ward of Shahid Bahonar Hospital of Kerman were evaluated. Information about these subjects was recorded in a questionnaire that included demographic data, type of trauma, current consumption status of Valgel's cigar and drug (according to the individual). Data were analyzed by SPSS software version 22 and P value less than 0.05 was considered statistically significant.

Findings 37% opium members, 23% of participants, 19% of NAS participants, 14% of methadone participants, 4% of cannabis participants and 3% of other existing drugs. 67% of participants in smoking research and 35% mentioned alcohol consumption with narcotics. The average duration of drug use in participants was 6.55 ± 1.86 . 60% of the people used the method of smoking, 23% of the subjects used the injection method and 17% of the people used the oral method for drug use. The distribution of the current consumption of opioids was 32.7% in all cases examined.

Conclusion: Since drug addiction has many problems with anesthetic procedures before orthopedic surgery, if it does not pay attention to it, it can threaten the patient's life. Therefore screening patients in the orthopedic part seems to be necessary in terms of credibility.

Keywords: Drug Abuse, Orthopedic Ward, Kerman



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
دانشکده پزشکی - آموزش بالینی

نمره نهایی دفاع از پایان نامه

پایان نامه تحصیلی دکتر مریم سالاری
تحت عنوان: بررسی فراوانی سوء مصرف مواد مخدر و عوامل وابسته به آن در بیماران جراحی
ارتوپدی بیمارستان باهنر نیمه اول سال ۹۶

جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ با حضور اساتید راهنما و اعضای محترم هیئت داوری دفاع و با میانگین نمره ۲۰ مورد
تایید قرار گرفت.

استاد راهنما

دکتر مرتضی هاشمیان

استاد مشاور

دکتر حسین طراوتی

سمت

استادیار

استادیار

دکتر حسین طراوتی
فلوشیپ جراحی اعضا
استادیار جراحی
۵۳۶۷۸

مهر و امضای دبیر کمیته بررسی پایان نامه